







RSI előtti kérdés felelet csekklista

Megjegyzés: Ez a csekklista csak stabil beteg esetén használható, azonnali fenyegetettség esetén nem szabad időt veszíteni az olvasására

Fentanyl premedikáció beadvaµg	IGEN
Stifneck kinyitva	IGEN
MILS megfelelő	IGEN
Szorosan illeszkedő rezervoáros oxigénmaszk, rezervoár mozog a légzéssel	IGEN
Oxigénpalack: még minimum félig	IGEN
Tartalék oxygen palack	IGEN
Kezdeti vérnyomás, monitor folyamatos mérésen	IGEN
Szaturáció folyamatosan ellenőrizve	IGEN
Kapnográf a monitorhoz csatlakoztatva, bekapcsolva	IGEN
Intravénás kanül átöblítve, átjárható	IGEN
Második vénás kanül	IGEN
Indukciós szer, dózisa: x mg
Szucinilkolin dózisa: x mg
Laringoszkóp, lapoc mérete:
Alternatív lapoc, mérete:
Szívó működik, elhelyezve	IGEN
Másodlagos szívó (kézi) működik	IGEN
Bougie méreteCh
ET tubus mérete:mm
Tubus mandzsetta ellenőrizve, csatlakozó szorosan illeszkedik	IGEN
Fecskendő mandzsettához	IGEN
Alternatív tubus mérete:mm
Ballon-rezervoár oxigénhez csatlakoztatva (maszk külön)	IGEN
Légzőkör: Filter, kapnográf adapter, (EMMA)	IGEN
Szalag tubusrögzítéséhez	IGEN
LMA, mérete:	IGEN
Sebészi légút felszerelés	IGEN
Oropharyngealis és 2 nasopharyngealis tubus – méretek:	IGEN
Azonnali thoracostomia szükséges ?	(megbeszélve)
Sellick műfogás javasolt? - megfelelően!	(megbeszélve)
Gyógyszerek: hova – sorrend – milliliter	IGEN

Peri arrest RSI csekklista

- oxigén
- vénás út
- gyógyszerek (indukciós szer, succinilcholin)
- laringoszkóp
- szívó
- bougie
- tubus (méret)
- fecskendő a cuff felfújásához
- ballon, szelep maszk

	címke	fecskendő méret	mg/ml	dózis mg/ml
fentanyl		10 ml	0,05	1-2 mikro
succinilcholin		2x2 ml	50	2
pancuronium		5 ml	2	0,1
etomidate		10 ml	2	0,3
midazolam		10 ml	1	0,02
ketamin		10 ml	10	0,5 2

